



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

آنتی دوت داروها

مسمومیت با	آنتی دوت	دوز از مصرفی
آتروپین و آنتی کولینرژیک ها، ضد افسردگی های سه حلقه ای (آمی تریپتیلین، داکسپین، ایمی پرامین، نورتریپتیلین، ...)	فیزوستیگمین	بالغین: 2-5 mg آهسته وریدی، در صورت داشتن علائم 2-1 mg پس از 20 دقیقه و در صورت ادامه علائم، تکرار با 4-1 میلی گرم کودکان: 0.2-0.5 mg آهسته وریدی در صورت داشتن علائم تکرار طی 5 دقیقه
استامینوفن	استیل سیستئین	در صورت مسمومیت بالای 48 ساعت و تست کبدی غیر نرمال 140mg/kg خوراکی در ابتدا و دوز نگهدارنده 70mg/kg هر 4 ساعت تا 17 مرتبه تزریق IV تا دوز 21 گرم
انسولین و داروهای کاهنده قند خون	گلوکز هایپرتون، گلوکاکون، اکترنوتاید	گلوکز هایپرتون: در بالغین 25-10 گرم و در اطفال 2 cc/kg از محلول دکستروز 10 درصد جهت کنترل هایپوگلیسمی حاد و سپس تا نرمال شدن سطح گلوکز 6-8 mg/kg/min انفوزیون می شود. گلوکاکون: دوز بولوس گلوکاکون mg/kg 0.05-0.15، بعد از آن دوز انفوزیون آن 1-10 در ساعت تا دوز 50mg اکترنوتاید: 1mcg/kg به صورت IV یا SC هر 12 ساعت



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

بالغین: 0/2mg به صورت ۷ به مدت 30 ثانیه سپس 0/3 mg IV به مدت 30 ثانیه و ادامه دادن دوزهای 0/5 mg در طی 30 ثانیه با فواصل 1 دقیقه تا دوز جمعی 3-5 mg کودکان: دوز ابتدایی 0/01mg/kg-0/005 به شکل تزریق آهسته وریدی و سپس 0/01mg/kg/h-0/005 انفوزیون پیوسته با حداکثر دوز 1mg	فلومازینیل	بنزودیازپین ها (کلونازپام، دیازپام )
دوز بولوس گلوکاکون 0/15 mg/kg- 0/05 mg، بعد از آن دوز انفوزیون آن 1-10 در ساعت تا دوز 50 میلی گرم	گلوکاکون	داروهای بتابلاکر (پروپرانولول، متوپرولول، ...)
کلسیم کلراید: 8-16mg/kg از محلول 10% (در صورت نیاز قابل تکرار است) گلوکاکون: دوز بولوس گلوکاکون mg/kg 0/05-0/15 بعد از آن دوز انفوزیون آن 1-10 میلی گرم در ساعت تا دوز 50 میلی گرم	کلسیم کلراید، گلوکاکون	داروهای بلوکه کننده کلسیم
تزریق 2 الی 3 آمپول به صورت وریدی یا زیر جلدی، هر 2 میلی گرم در 10 سی سی نرمال سالین رقیق شود.	نالوکسان	مخدرها



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز

توزیع زیر جلدی ویتامین کا ، تا حداکثر دوز 30 میلی گرم	ویتامین کا	وارفارین
بالغین: تزریق وریدی پروتامین سولفات به آرامی بیش از 3 دقیقه (در مصرف در هر 10 دقیقه نباید بیش از 50 میلی گرم باشد) در تزریق sc آن 25-50 میلی گرم دوز بارگیری و متعاقب آن انفوزیون وریدی باقیمانده دوز محاسبه شده در 8-16 ساعت 1 میلی گرم پروتامین ، 90 واحد هپارین ریه گاوی یا 115 واحد هپارین روده ای خوک را خنثی میکند	پروتامین سولفات	هپارین

واحد ایمنی-مجمع آموزشی درمانی امام علی(ع)