



مدت زمان تزریق آنتی بیوتیک ها در بیمارستان

نام دارو	مدت تزریق وریدی	توضیحات
آمپی سیلین	10-15 دقیقه	
آمیکاسین	بزرگسالان : 30-60 دقیقه کودکان : 1-2 ساعت	رقیق شود.
اریترومایسین	20-60 دقیقه	
ایمی پنم/سیلاستین	30-60 دقیقه	
پلی میکسین B	60-90 دقیقه	
جنتامایسین	30-120 دقیقه	
داکسی سایکلین	1-4 ساعت	
ریفامپین	3 ساعت اگر 100ml باشد : 30 دقیقه	
سفوتاکسیم	رقیق شده : 20-30 دقیقه	غیر رقیق : 3-5 دقیقه
سفتی زوکسیم	رقیق شده : 15-30 دقیقه	
سفتریاکسون	15-30 دقیقه	
سفتازیدیم	3-5 دقیقه	
سیپروفلوکساسین	بیش از 60 دقیقه	در رگ های بزرگ تزریق شود.
کلیندامایسین	10-60 دقیقه	با سرعت کمتر از 30mg/min
کوتریماکسازول	60-90 دقیقه	
مروپنم	رقیق شده : 15-30 دقیقه	غیر رقیق : 3-5 دقیقه
مترونیدازول	1 ساعت	
ونکومایسین	رقیق شده طی حداقل 1 ساعت	

Reference : Handbook on injectable drugs ,11 edition , Lawrence A.Trissel

واحد ایمنی - مجتمع آموزشی درمانی امام علی (ع)